

# **Intraorális, helyi érzéstelenítés menete, következménye és a leggyakoribb szövődmény lehetőségek**

## **A beavatkozás:**

A fogászati beavatkozás fájdalommentessé tétele érdekében a kezelőorvos döntése alapján vagy a páciens kérésére intraorális, helyi érzéstelenítést alkalmazunk. Minden esetben egyszerhasználatos, steril tűt, fecskendőket és érzéstelenítőszer alkalmazunk.

A páciens az érzéstelenítő beadását visszautasíthatja, ez esetben a kezelőorvos dönti el, hogy érzéstelenítés nélkül a tervezett beavatkozást vállalja vagy sem.

A páciens tájékoztatjuk, hogy ha kérdése merül fel, vagy bármi olyat tapasztal, amire nem készítettük fel, telefonon vagy személyesen ismét vegye fel a kapcsolatot rendelőnkkel.

## **A beavatkozás következményei lehetnek:**

Helyi duzzanat, fájdalom, szájnnyitási korlátozottság, hőemelkedés.

## **Lehetséges szövődmények:**

Allergiás reakciók, hányás, szédülés, látászavar, szájnnyitási korlátozottság, rossz közérzet, izomrángás, zsibbadás, tű törése, idegsérülés, tartós utó fájdalom vagy érzéketlenség, érsérülés, lágyszövet-sérülés, idegentest nyelése vagy félrenyelése, helyi vagy általános gyulladás, vérzés, általános szövődmények.