

Áttörésben elmaradt vagy akadályozott bölcsességfog eltávolításának műtéti megoldása, következménye és a leggyakoribb szövődmény lehetőségek

Műtéti megoldás:

A fog eltávolítása az akadályozottság mértékétől és a fog tengelyállásától függően lebenyképzéssel vagy anélkül, fogóval, emelővel, szükség esetén a fog körüli csont eltávolításával, ill. a fog felezésével történik. Ezután a sebet óvatosan kikaparjuk, ügyelve a környező képletek épségére. Genny jelenléte esetén mikrobiológiai minta-vétel történik. A sebet nyomótamponnal és/vagy varrattal és/vagy belső tamponálással látjuk el. Egyes esetekben a bölcsességfog eltávolítása csak az előtte lévő 7-es fog egyidejű eltávolításával valósítható meg.

Esetleges alternatív megoldás: amennyiben a 8-as fog előtörése súlyosan destruált koronájú 7-es fog eltávolításával akadálytalanná tehető, úgy ez utóbbi eltávolítása javasolt.

Műtéti következmények:

Helyi duzzanat, fájdalom, szájnyitási korlátozottság, nyelési nehézség, hőemelkedés.

Lehetséges szövődmények:

Arcüreg megnyílása, felső, ill. alsó állcsont részleges vagy teljes törése, idegsérülés, érsérülés, fogsérülés, lágyrész-sérülés, idegentest nyelése vagy félrenyelése, helyi vagy általános gyulladás, általános szövődmények.