

Állcsont törések konzervatív kezelésének menete, következménye és a leggyakoribb szövődmény lehetőségei

Menete:

Konzervatív kezeléskor a meglévő alsó-felső fogakra ún. dentalis síneket erősítünk fel dróttal, majd az alsó-felső sánt gumigyűrűvel kötjük össze, azaz az alsó-felső fogsort összezárjuk. Ezáltal az állcsontok törvégei eredeti, megfelelő helyzetükbe kerülnek és a fogak érintkezése normális lesz. Ezt a rögzítést a betegnek 4-6 hétig kell hordania a biztonságos csontgyógyulás érdekében.

Következmények:

A fogsorok összezárása miatt nehezebb a beszéd, a táplálkozás, a szájhigiéne, esztétikailag is zavaróan hat. Sokszor a beteg a munkáját nem tudja ellátni, azon kívül helyi duzzanat, fájdalom, bevérzés, ínygyulladás jelentkezhet.

Egész idő alatt a beteg részéről fokozott szájhigiéne igényel és rendszeres kontroll vizsgálatokat!

Lehetséges szövődmények:

Fogsérülés, lágyszövet sérülés, idegentest nyelése, vagy félrenyelése, helyi vagy általános gyulladás, törvégek nem megfelelő csontosodása, állízület kialakulása, csontthártya és csontvelőgyulladás, fogak elhalása, kilazulása, ízületi fájdalom, érzészavarok fellépése átmenetileg, esetleg tartósan.